

Imię i nazwisko	
Termin	Badanie

Przygotowanie do badania MR w znieczuleniu

ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra

Ważne informacje:



Na **6 godzin** przed badaniem należy pozostać **na czczo**



Do **2 godzin przed badaniem można pić** płyny klarowne np. woda, herbata



Osoby, które przyjmują **na stałe leki** (przeciwpadaczkowe, przeciwalergiczne itp.) powinny je zażyć w dniu badania tak jak zwykle i popić niewielką ilością płynu - ok. 10 ml



Na badanie należy zgłosić się ok. **30 min.** przed wyznaczoną godziną



W przypadku badania z kontrastem, konieczne jest **okazanie wyniku kreatyniny, nie starszego niż 7 dni**



Na badanie należy przyjść w **odzieży niezawierającej elementów metalowych** (guzików, nitów, zapięć, zamków błyskawicznych itp.). Twarz powinna być **bez makijażu**. Przed badaniem **należy zdjąć** okulary, biżuterię, zegarek, aparat słuchowy, protezy zębowe



Do pomieszczenia z aparatem MR prosimy **nie wносить metalowych przedmiotów**, a w szczególności telefonów komórkowych, kart kredytowych, zegarków lub innych urządzeń elektronicznych



Badaniu towarzyszy zwiększone **natężenie hałasu**. Dla większego komfortu, Pacjent otrzymuje słuchawki z systemem audio

Pamiętaj! W dniu badania należy ze sobą zabrać:



- **Dokument tożsamości** pacjenta i opiekuna, książeczkę zdrowia dziecka.
- Pacjent lub jego opiekun powinien przynieść ze sobą **wyniki wcześniejszych badań - płyty i opisy**, karty informacyjne leczenia szpitalnego itp.
- **W przypadku wszczepionych implantów** należy dostarczyć **dokumentację medyczną oraz zaświadczenie lekarskie** o braku przeciwwskazań do badań.
- Pacjenci z **wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedycznymi, klipsami naczyniowymi** po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych są zobowiązani przed wykonaniem badania dostarczyć **kompletną dokumentację medyczną** dotyczącą zastosowanego leczenia wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a w szczególności materiału z jakiego został wykonany oraz powiadomić o powyższym personel pracowni.

Przeciwwskazania do badania:



Bezwzględne:

- rozrusznik serca
- neurostymulatory
- opłuki metalowe w gałce ocznej
- implanty słuchowe
- ciąża
- Pacjenci **w trakcie infekcji górnych dróg oddechowych** nie mogą być znieczulani. Badanie w sedacji może być przeprowadzone **minimum 14 dni po** ustąpieniu infekcji.
- **W przypadku występowania u pacjenta chorób przewlekłych** może zaistnieć **potrzeba wykonania dodatkowych badań** laboratoryjnych lub konsultacji specjalistycznych, o czym decyduje lekarz anestezjolog.

Względne - wymagające dostarczenia dokumentacji leczenia:

- metaliczne implanty ortopedyczne
- stabilizatory
- sztuczna zastawka serca
- druty i śruby
- klipsy naczyniowe

Uwaga!



Pacjent lub jego opiekun zobowiązany jest **udzielić szczegółowych odpowiedzi** na zadawane przez lekarza anestezjologa pytania **odnośnie stanu zdrowia** i wywiadu chorobowego pacjenta. Zatajenie jakichkolwiek informacji lub **podanie nieprawdy**, w szczególności godziny ostatniego posiłku, może skutkować powstaniem **sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu** pacjenta.



Każdy pacjent (bez względu na wiek) **po znieczuleniu wymaga opieki** osoby dorosłej, która **zapewnia transport** do miejsca zamieszkania. Nie zaleca się korzystania z komunikacji publicznej. Wskazana jest **podróż w pozycji siedzącej**. Po znieczuleniu przez okres jednej doby bezwzględnie zakazuje się prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W przypadku występowania u pacjenta **chorób przewlekłych** (zaburzenia hormonalne, wady serca, astma, cukrzyca) może zaistnieć **potrzeba wykonania dodatkowych badań** laboratoryjnych lub konsultacji specjalistycznych, o czym decyduje lekarz anestezjolog.



UWAGA PO BADANIU

Jeśli podany był kontrast - w okresie 24 godzin po badaniu należy wypić w miarę możliwości więcej płynów obojętnych (1,5-2 litry wody niegazowanej).

Kobiety karmiące piersią nie powinny karmić dziecka piersią w ciągu najbliższych 24 godzin, a ściągnięty pokarm powinien być wydalony.